

CARA PENGAMBILAN

Anda penderita
DIABETES



FEELING UNWELL



FEELING TIRED



PASSING MORE
URINE



THIRST

Botol pertama

- Pada peringkat awal, bacaan glukos berkemungkinan **menurun atau meningkat** dengan mendadak
- Sistem pertahanan badan sedang membiasakan diri dengan **Kacip Emas**



Botol 2 - 7

- Bilangan botol **bergantung kepada kekuatan antibodi** setiap individu
- **Kacip Emas** memperkuat sistem imunisasi, meningkatkan penghasilan insulin secara semulajadi
- **Simptom hilang** : kurang rasa kebas, letih dan dahaga; kekerapan buang air kecil menurun, luka makin sembuh



Bacaan glukos normal

- Boleh berhenti jika bacaan glukos pada tahap ideal (**3.5 hingga 6.7 mmol/L**)
- Jaga makan, bersenam, amalkan gaya hidup sihat
- Boleh teruskan mengambil Kacip Emas
 - minum **Kacip Emas** 50ml sehari (1 botol = 20 hari)
 - kapsul **Kacip Emas**

TAHAP GLUKOSA DALAM DARAH GLUCOSE LEVEL IN BLOOD

Waktu	Tahap Glukosa (mmol/L)		
	Ideal*	Diterima	Teruk
Sebelum Sarapan	3.5 - 5.3	3.9 - 7.8	> 7.8
Sebelum Makan	3.5 - 5.8	3.9 - 7.8	> 7.8
2 Jam Selepas Makan	4.4 - 6.7	4.4 - 10.0	> 10.0
0200 - 0400 Jam	> 3.9	> 3.9	

*Tahap ideal adalah sama bagi mereka yang menghidap diabetes dan disyorkan untuk ibu-ibu yang mengandung jenis 2 DM (NIDDM).